



**■ Saisonales Malariarisiko (P\*):**

Mai bis November: Chemoprophylaxe plus Expositionsprophylaxe  
 Dezember bis April: Expositionsprophylaxe; in Risikosituationen (s. Erläuterungen im Text): zusätzliche Mitnahme einer Notfallselbstbehandlung

**■ Geringes Malariarisiko (NSB):**

Expositionsprophylaxe; in Risikosituationen (s. Erläuterungen im Text): zusätzliche Mitnahme einer Notfallselbstbehandlung

**■ Minimales Malariarisiko (EP):**

Expositionsprophylaxe

**■ Kein Malariarisiko**

© ECRM und Thieme Gruppe

Quellen: World Malaria Reports 2016, 2017, 2018; angepasst von Dr. Olivia Veit, ECRM

Die eingetragenen Grenzen, Namen und verwendeten Bezeichnungen sind nicht als Stellungnahme zum rechtlichen Status der Länder, Gebiete oder Städte und ihrer Behörden oder zum Verlauf ihrer geografischen und politischen Grenzen zu verstehen.

Empfehlungen des DTG-Ausschusses STAR (Ständiger Ausschuss Reisemedizin), Stand: August 2020

**Regionalkarte Südasien: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka.**